

Utdrag från Skogsstyrelsens ”Inventering av barknag i Dalums socken” 2010-08-31.

Orsaker till barknag

Orsaken till att barknag uppstår kan vara flera. Bark ingår i det foderutbud som skogen erbjuder älgen eftersom det finns näring i barken. Bark från granstammar är normalt inte en eftertraktad födokälla för älgen men kan öka i betydelse då viltstammen relativt sett är tät och eller där fodertillgången är låg. Markerna runt Dalum är generellt bördiga och andelen gran i skogslandskapet är hög. Tillgången på ett mer eftertraktat foder i form av yngre tall och löv är i motsvarande grad relativt liten.

Att det skulle röra sig om enstaka individer som utvecklat ett avvikande beteende med särskild preferens för barknag i granskog är inte troligt då rapporter om barknag inkommit från många håll i distriktet. Det är inte ens troligt att de färskas betesskadorna på aktuella fastigheter i Dalum orsakat av samma individer då åtminstone en av fastigheterna är skild från de övriga genom naturliga vandringshinder. Antalet inrapporterade fall av barknag till Skogsstyrelsens distrikt i Sjuhärad ökade markant efter den snörika och långa vintern 2009/2010. Vintern kan mycket väl vara en bidragande orsak till förhöjda skadenivåer. Orsaken är främst att markvegetationen under snön inte är tillgänglig samt ökade energikostnader för djuren att söka efter foder p.g.a. av den djupa snön. Om utfordring med t.ex. ensilage har gjorts i närområdet är detta även en faktor som kraftigt ökar risken för skador i närheten av utfodringsplatsen. Skogsstyrelsen har dock inte kunskap om sådan utfordring skett i området.